Una (imperfetta) categorizzazione dei tipi di modelli digitali 3D					
		ELEMENTI DISCRETI			CONTINUI
		regolari <i>«a griglia»</i>	semi-regolari o irregolari		
			elementi simpliciali	elementi non simpliciali	
SUPERFICIALI	2-manifold <i>«rappresenta una vera superficie»</i>	Height Field Range Scan Geometry Images	Triangle Mesh	Polygonal Mesh Quad Mesh Quad dominant Mesh	Subdivision surfaces Parametric Surfaces
	non-manifold <i>«non rappresenta una sup»</i>	Set di Range Scan	Point Cloud		
VOLUMETRICI	(3-manifold)	Voxelized Volume Volumetric Textures	Tetra Mesh	Hexa Mesh	Implicit models <i>(es. CSG)</i>

3

Superfici parametriche

- ✓ Modo di rappresentare superfici curve
- ✓ Non solo «lineari a tratti» (come le mesh) ma «quadratiche (o cubiche, o quartiche) etc. a tratti»
- ✓ Molto utilizzato per CAD/CAM

4

Curve parametriche

- ✓ Vediamo prima un caso più semplice (ma pure molto usato):
le **curve parametriche**
 - ⇒ Una rappresentazione per linee curve (in 2D o 3D)
- ✓ Il caso **superfici** sarà una sua generalizzazione

5

Miniripasso su terminologia delle funzioni in generale

Immagine di f :

insieme di elementi del codominio di f raggiunti da f

$$\text{immagine}(f) = \{b \in B . \exists a \in A. f(a) = b\}$$

Esempio: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$

dominio di f : numeri naturali

codominio di f : numeri naturali

immagine di f : numeri naturali pari

7

Curva parametrica

- ✓ Curva descritta come immagine di una funzione

$$f: A \rightarrow B$$

$$A \subseteq \mathbb{R}$$

$$B = \mathbb{R}^2 \text{ o } \mathbb{R}^3$$

- ✓ $B = \mathbb{R}^2$ curve in 2D
(linee curve disegnate su di un foglio) $f(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
- ✓ $B = \mathbb{R}^3$ curve in 3D
(linee curve che "fluttuano" nello spazio) $f(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

⇒ La curva è quindi "l'immagine di una funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$)"

- ✓ t è detto il parametro, o la posizione parametrica
- ✓ A , il dominio di f , è detto il "dominio parametrico"
- ✓ B , l'immagine di f , è la nostra curva (un luogo di punti)
- ✓ Se $f(t)$ è un polinomio di t , la curva si dice polinomiale

8

Usi delle curve parametriche: in 2D

- ✓ Design di grafica vettoriale, come CAD 2D

9

Usi delle curve parametriche: in 2D o 3D

- ✓ in Computer Animation: rappresenta la traiettoria di un oggetto
 - ⇒ la coordinata parametrica t rappresenta il tempo
 - ⇒ $f(t)$ = la posizione dell'oggetto al tempo t

11

Curva parametrica

$$f: A \rightarrow B$$

$$A \subseteq \mathbb{R}$$

$$B \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$f(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

12

Esempio giocattolo:

- ✓ Un segmento dritto come “curva” parametrica
 - ⇒ (in questo caso, non è «curva», cioè non ha curvatura)
 - ⇒ Il segmento fra due punti $\mathbf{p}_0$, $\mathbf{p}_1$ è il luogo di punti raggiunti dalla funzione

$$f(t) = \mathbf{p}_0 \cdot (1 - t) + \mathbf{p}_1 \cdot t$$

$$= \mathbf{p}_0 + (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0) \cdot t$$

14

Note sull'esempio giocattolo...

- ✓ In questo esempio, *ed anche in generale...*
 - ⇒ i punti $\mathbf{p}_0$ e $\mathbf{p}_1$ sono costanti nella formula di f
 - ⇒ sono detti i «**punti di controllo**» della curva: modificandoli, modifico la forma della curva
- ✓ in questo esempio... (ma in generale, non sarà sempre così)
 - ⇒ La curva è un polinomio **lineare**, cioè di grado 1 (in generale, si usano polinomi di grado superiore)
 - ⇒ la curva passa *attraverso* i due punti di controllo
 - ⇒ i punti di controllo sono solo 2
 - ⇒ i punti di controllo sono l'inizio e la fine della curva
 - ⇒ la direzione tangente è **costante** per ogni t , (calcolarla!) cioè la «curva» non è... curva (è dritta, non è incurvata)
- ✓ Vedremo esempi di grado superiore

15

Curve parametriche: quale direzione tangente?

- ✓ Data una curva e un punto p su di essa, la retta tangente è la retta che è passa per p e ha lo stesso orientamento della curva in p
- ✓ La direzione tangente è la direzione della retta tangente

- ✓ Vediamo come calcolare la direzione tangente per un dato punto su di una curva parametrica

⇒ Esercizio: applica poi la regola per trovare la dir tangente nell'esempio giocattolo, e verifica che la risposta è quella che ci si aspetterebbe

17

Curve parametriche: quale direzione tangente?

- ✓ Dato un parametro t , il punto $f(t)$ è sulla curva (per costruzione).
- ✓ Quale vettore è tangente della curva in quel punto?
- ✓ Dobbiamo chiederci di quanto si sposta il punto $f(t)$ quando t incrementa di un piccolo delta ε

- ✓ Risposta:

⇒ si sposta nel punto $f(t + \varepsilon)$

⇒ cioè si sposta del vettore $f(t + \varepsilon) - f(t)$

⇒ dividendo per ε , ottengo lo spostamento (ancora un vettore) per unità di incremento della variabile parametrica t

$$\frac{f(t+\varepsilon) - f(t)}{\varepsilon}$$

⇒ il limite con $\varepsilon \rightarrow 0$ è il vettore tangente che cerco

⇒ cioè la derivata f' di f calcolata in t : $f'(t)$

⇒ Se normalizzo, ottengo la direzione (vettore unitario)

$$\frac{f'(t)}{\|f'(t)\|} = \text{direzione tangente della curva nel punto } f(t)$$

18

Lo zoo delle curve parametriche

- ✓ Sono stati proposti diverse funzione, come:
 - ⇒ Hermite Splines
 - ⇒ Bézier splines ← vediamo queste
 - ⇒ B-splines
 - ⇒ NURBS (polinomi razionali)
- ✓ Differiscono in:
 - ⇒ La formula che definisce f
 - ⇒ Se la curva è interpolativa o approssimativa
 - ⇒ Se la curva è una spline, cioè se è una f è formula polinomiale in t
 - ⇒ Il grado di continuità

21

Spline

- ✓ E' una curva polinomiale "a tratti"
 - ⇒ Di un certo grado n
- ✓ Cioè è l'unione di un certo numero di pezzi, detti **archi**, uniti alle estremità ciascuno dei quali è una curva parametrica polinomiale di un grado n ← Nell'esempio giocattolo, $n = 1$, ma normalmente, $n > 1$
- ✓ Una spline è controllata attraverso un insieme di **punti di controllo**
 - ⇒ si dice "approssimante" se ci passa "vicino" : i punti di controllo attirano a sè la curva
 - ⇒ si dice "interplante" se ci passa attraverso La curva "interpola" i punti di controllo
- ✓ Vediamo ora un esempio importante di Spline: le curve di Bézier

22

Spline

- ✓ E' una curva polinomiale a tratti
 - ⇒ Di un certo grado n
- ✓ Una spline è controllata attraverso un insieme di **punti di controllo**
 - ⇒ Si dice "approssimante" se ci passa "vicino"
I punti di controllo attirano a sè la curva
 - ⇒ Si dice "interplante se ci passa attraverso"
La curva "interpola" i punti di controllo
- ✓ Una spline è divisa in **archi**.
- ✓ Ogni punto su ogni arco sarà una certa interpolazione lineare dei punti di controllo
 - ⇒ i pesi sono un **polinomio** $P(t)$, di grado $n > 1$
 - ⇒ n è il grado della spline
(che quindi può essere quadratica, cubica, etc)
- ✓ Vediamo ora un esempio importante: le curve di Bézier

Nell'esempio giocattolo, $n = 1$, ma normalmente, $n > 1$

nota: non si tratta di una interpolazione *lineare* come quelle abbiamo visto

23

Curve di Bézier: note 1/2

- ✓ Sono una famiglia di splines di grado n qualsiasi
 - ⇒ La linea spezzata vista è una curva di Bézier di grado 1,
 - ⇒ Vediamo ora come si generalizza
- ✓ Alcune caratteristiche:
 - ⇒ Una curva di Beziér è composta da archi di Beziér (giunti alle estemità)
 - ⇒ Un arco di Beziér di grado n è controllato da $n+1$ punti di controllo
 - ⇒ L'arco è interpolante (passa attraverso) il primo e l'ultimo di questi punti, ma in generale non gli altri (la curva è solo approssimante per loro)
 - ⇒ Quindi, per rendere la curva continua («disegnabile senza staccare la penna dal foglio») basta far coincidere l'ultimo punto di controllo di un arco col primo dell'arco successivo

Verificalo per il grado 1

24

Curve di Bézier: note 2/2

- ✓ Le curve di Beziér cubiche ($n=3$) sono le più usate
 - ⇒ Vedremo presto perché
- ✓ Ci sono due modi equivalenti di definire un arco di curva di Beziér (di grado n):
 - ⇒ Formulazione matematica originale, i cui pesi dei punti di controllo sono un certo polinomio di t (anni '50, Pierre Beziér)
 - ⇒ Formulazione «grafica»: algoritmo di DeCasteljau
 - ⇒ (vedremo questa seconda scelta)
- ✓ Cenni storici:
 - ⇒ le curve di Beziér sono nate per progettare le fusoliere delle automobili.

25

Formulaz. di De Casteljau: esempio per grado 2

- ✓ Ho tre «control point» $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$
- ✓ Data la coordinata parametrica $t \in [0..1]$, trovo :
 - ⇒ il punto $\mathbf{q}_0$ interpolando fra $\mathbf{p}_0$ e $\mathbf{p}_1$ (con t)
 - ⇒ il punto $\mathbf{q}_1$ interpolando fra $\mathbf{p}_1$ e $\mathbf{p}_2$ (con t)
- ✓ Infine
 - ⇒ ottengo il punto finale $f(t)$ interpolando fra $\mathbf{q}_0$ e $\mathbf{q}_1$ (di nuovo con t)

(Esercizio: seguire le istruzioni su un disegno)

Demo: <http://www.malinc.se/m/DeCasteljauAndBezier.php>

26

Formulaz. di De Casteljau: esempio per grado 3

- ✓ 4 «control point» p_0, p_1, p_2, p_3
- ✓ data una posizione parametrica t , trovo:
 - ⇒ il punto q_0 interpolando fra p_0 e p_1 (con t)
 - ⇒ il punto q_1 interpolando fra p_1 e p_2 (con t)
 - ⇒ il punto q_2 interpolando fra p_2 e p_3 (con t)
- ✓ poi
 - ⇒ il punto r_0 interpolando fra q_0 e q_1 (con t)
 - ⇒ il punto r_1 interpolando fra q_1 e q_2 (con t)
- ✓ e infine
 - ⇒ il punto finale $f(t)$ interpolando fra r_0 e r_1 (con t)

(Esercizio: seguire le istruzioni su di un disegno)

27

Curva di Bezier di grado 3 in forma di codice

L'algoritmo di De Casteljau ci fornisce un modo per codificare la funzione f in modo semplice:

```
vec3 bezier( float t, // posiz. paramet.
             vec3 p0, vec3 p1,
             vec3 p2, vec3 p3)
{
    vec3 q0 = mix(p0, p1, t); // cioè // p0*(1-t)+p1*t
    vec3 q1 = mix(p1, p2, t);
    vec3 q2 = mix(p2, p3, t);
    vec3 r0 = mix(q0, q1, t);
    vec3 r1 = mix(q1, q2, t);
    return mix(r0, r1, t);
}
```

28